Notitie

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht
Postbus 80015
3508 TA Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 42 56

Aan
Provincie Groningen

Van
M.F. van Os, B.M. ten Brug, P.C. Tromp

Onderwerp
Resultaten metingen siliciumcarbide vezels in het nieuwe meetnet luchtkwaliteit industriegebied Oosterhorn, 2e meetperiode 2024.

Datum
Mei 2024

Onze referentie
27522-52

E-mail
peter.tromp@tno.nl

Achtergrond

Het bedrijf ESD-SiC maakt siliciumcarbide uit cokes, kwartszand en grafiet. Bij het proces worden genoemde grondstoffen bij hoge temperatuur met elkaar in contact gebracht. Bij deze hoge temperatuur ontstaat het gewenste siliciumcarbide, een bijzonder harde, vaste stof. Tijdens het proces ontstaat procesgas (met waterstof, kooldioxide, koolmonoxide en kleine hoeveelheden aan methaan en zwavelverbindingen). De sterk geurende zwavelverbindingen kunnen, als ze vrijkomen in de buitenlucht, aanleiding geven tot klachten in de omgeving. De klachten van omwoners in de omgeving van industriegebied Oosterhorn zijn mede aanleiding geweest voor een onderzoek naar de luchtkwaliteit aldaar.
Naast de geurklachten ontstaan met een zekere regelmaat (in het verleden gemiddeld een aantal keer per maand), tijdens het proces, zogenaamde blazers waarbij een gedeelte van de ovens (waarin de genoemde grondstoffen) ontploft. Daarbij wordt een grote hoeveelheid grondstoffen (o.a. omloopmateriaal) de lucht in geschoten wat kan leiden tot stofoverlast in de omgeving. Het aantal blazers per maand is overigens de laatste tijd sterk afgenomen.

Meetnet industriegebied Oosterhorn

Vanaf oktober 2018 tot en met september 2020 hebben diverse metingen plaatsgevonden in de omgeving Oosterhorn met behulp van een uitgebreid meetnet. Het doel van het meetnet was te onderzoeken welke concentraties van fijn stof en andere verontreinigingen in de lucht in dit gebied voorkomen. In het uitgebreide meetnet waren op verschillende plaatsen in het industrieterrein meetstations ingericht waar monitoren stonden opgesteld waarmee de concentratie van koolmonoxide, roet (black carbon) en fijn stof werd gemeten. Daarnaast stonden op drie meetstations op het industrieterrein en drie meetstations in de woonkernen (Farmsum, Borgsweer en Wagenborgen) apparatuur opgesteld waarmee luchtmonsters werden genomen voor chemische karakterisering van zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, geurstoffen en siliciumcarbide vezels. In de overzichtsrapportage over het meetnet (zie [1]) zijn de resultaten van bovengenoemde metingen opgenomen, inclusief schattingen van jaargemiddelde blootstellingen.

[1] Tromp, Duyzer (2020) Meetnet luchtkwaliteit op en rond het bedrijventerrein Oosterhorn Delfzijl. TNO- rapport TNO 2020 R10224

De aanwezigheid van siliciumcarbide vezels zijn voor TNO aanleiding geweest om de provincie Groningen apart te informeren via maandelijkse notities met resultaten. De vezels zijn afkomstig van het terrein van ESD. Er zijn geen andere bronnen van deze vezels. In de laatste notitie van oktober 2020 zijn alle meetresultaten samengevat (zie [2]). Vanaf oktober 2020 is het toenmalige, uitgebreide, meetnet stopgezet en is met een nieuw meetnet gestart. Daarbij zijn de locaties voor het nemen van luchtmonsters gehandhaafd. De chemische analyses in de monsters is echter beperkt tot siliciumcarbide vezels. Figuur 1 geeft de ligging van deze meetstations weer:

- KBM Master Alloys (~750 meter vanaf ESD-SiC)
- RWZI Delfzijl (~1,3 km vanaf ESD-SiC)
- Geefsweersterweg (~2,1 km vanaf ESD-SiC)
- Farmsum, Zijlvest (op het terrein van Rijkswaterstaat, ~3,0 km vanaf ESD-SiC)
- Borgsweer, Borgsweer (bij particulier in de tuin, ~3,0 km vanaf ESD-SiC)
- Wagenborgen, Familie Bronsweg (bij particulier in de tuin, ~5,0 km vanaf ESD-SiC)



Figuur 1. *Ligging van de huidige meetstations van het meetnet in de omgeving van industriegebied Oosterhorn.*

[2] Ten Brug, Tromp, Duyzer (2020) Resultaten metingen siliciumcarbide vezels in het meetnet luchtkwaliteit industriegebied Oosterhorn, 20e meetperiode. TNO-notitie 27522-36

Nieuwe aanpak van het onderzoek

In het nieuwe meetnet, dat vanaf 12 november 2020 van start is gegaan, is in overleg met de Provincie Groningen gekozen voor een nieuwe aanpak van het onderzoek. Deze aanpak is besproken met de verschillende belanghebbenden verenigd in de projectgroep Luchtapp en Meetnet.[3] De nieuwe aanpak gaat uit van continue monsterneming gedurende drie maanden. De resultaten kunnen op deze manier direct getoetst worden aan de door het RIVM geadviseerde risicogrenswaarde van 300 vezels/m^3 (zie [4]).

Bemonstering

Op de zes meetlocaties wordt gedurende drie maanden continu (onafhankelijk van windrichting en -snelheid) lucht aangezogen over met nikkel of goud gecoate, polycarbonaat filters met een diameter van 4 cm (effectief filter oppervlak 12,57 cm^2) en poriediameter van 0,8 µm met een aanzuigdebiet (flow) van 0,5 en 1 L/min.[5] Per locatie en per meetperiode is de effectieve meetduur weergegeven in Tabel 1.

Analysemethode

In de monsters genomen op de meetstations wordt het fijn stof verzameld op de filters onderzocht met scanning elektronenmicroscopie in combinatie met röntgenmicroanalyse (SEM/EDX). Hiermee wordt bij een vergroting van 2000x specifiek gezocht naar siliciumcarbide vezels. Deze analyse is uitgevoerd conform de NEN-ISO 14966 “Ambient air – Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles – Scanning electron microscopy method”.

Tabel 1. *De effectieve meetduur per meetperiode (in uren) op de meetstations van het nieuwe meetnet Oosterhorn in de periode 19 december 2023 tot en met 3 mei 2024.*

Meetstation	Effectieve meetduur per meetperiode (uur)				
Meetperiode	Periode 1 19dec-6mrt	Periode 2 6mrt-3mei	Periode 3	Periode 4	*Totaal (jaar 2024)*
RWZI	1845	115[2)]			1960
KBM	1845	1331			3176
Geefsweersterweg	1845	1374			3219
Farmsum	810[1)]	528			1339
Borgsweer	1823	1354			3177
Wagenborgen	1116[1)]	742			1858

1) Door een defect aan de pomp heeft er op deze locatie in deze periode een kortere meetduur plaatsgevonden.
2) Door een defect bij het uitlezen van effectieve draaitijd van de pomp is de meetduur op deze locatie niet exact bekend, de waarde geeft de minimale meetduur, waarschijnlijk is de werkelijke meetduur langer geweest

[3] Naast vertegenwoordigers van de provincie bestaande uit: Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG), Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE), Groningen Seaport (GSP), Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMG) en Adviesgroep Geur Delfzijl

[4] Advies 14725A01 – Afleiden indicatieve humane MTR-lucht voor siliciumcarbide-vezels, 1 april 2019

[5] Voor 10 februari 2021 waren de aanzuigdebieten 1 L/min en 3 L/min, respectievelijk.

Resultaten

In Tabel 2 worden de resultaten van de metingen van siliciumcarbide vezels gepresenteerd van de 1e en 2e meetsessie van 2024 (19 december 2023 – 3 mei 2024) van de monsterneming in het meetnet met driemaandelijkse continue bemonstering. Het is belangrijk erop te wijzen dat de concentraties van stoffen in de lucht voortdurend variëren, zowel als gevolg van variaties in de weersomstandigheden, als door variaties in de uitstoot. De uitstoot kan daarnaast variëren door wisselende activiteiten op het terrein van ESD-SiC, inclusief het optreden van blazers.

In eerder opgestelde overzichtsrapportages werden aan de hand van modelberekeningen en meetresultaten de concentraties voor de hoofdstations afgeleid. Deze lagen tussen 5 en 20 vezels per m^3 en voor de woonkernen op minder dan 5 vezels per m^3. De in Tabel 2 gepresenteerde concentraties passen goed in dit beeld. In de tabel is ook het 95% aangegeven.[6]

Tabel 2. *De concentratie van siliciumcarbide vezels op de meetstations in meetperiode 1 (19 december 2023 – 6 maart 2024) en meetperiode 2 (6 maart – 3 mei 2024) van het nieuwe meetnet Oosterhorn.*

Meetstation	**Concentratie siliciumcarbide vezels >5µm** (vezels/m^3)				
Meetperiode	Periode 1 19dec-6mrt	Periode 2 6mrt-3mei	Periode 3	Periode 4	*Gemiddelde (jaar 2024)*
RWZI	5 (0-30)	-			5 (0-30)
KBM	<10	7 (1-24)			3 (0-12)
Geefsweersterweg	6 (0-32)	<10			2 (0-11)
Farmsum	11 (0-59)	7 (1-24)			8 (2-22)
Borgsweer	<10	<10			<10
Wagenborgen	<10	<10			<10

In eerdere rapportages is gesproken over de invloed van de windrichting op de voorkomende concentraties. Lage of hoge concentraties siliciumcarbide kunnen samenhangen met wisselende uitstoot op het ESD-terrein en met de meteorologische condities. In het verleden werden de meetresultaten geïnterpreteerd aan de hand van specifieke modelberekeningen, waarbij rekening werd gehouden met meteorologische grootheden zoals windrichting en snelheid. Zo kon een representatief jaargemiddelde worden afgeleid. Dergelijke berekeningen zijn in het huidige project niet voorzien. Wel is, oriënterend onderzocht in hoeverre de thans gemeten concentraties van siliciumcarbide vezels samenhangen met de in de meetperiode geldende condities. De

[6] Slechts een deel van het filter wordt tijdens de analyse bekeken. Hierbij bestaat de kans dat in het niet onderzochte deel vezels ook voorkomen (die dus gemist zijn). Bij de berekening van de concentratie uit de telling dient daarom rekening gehouden te worden met deze, mogelijk, gemiste vezels. Dit gebeurt door het aangeven van een onzekerheidsmarge die is uitgedrukt als het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit betekent dat de kans 95% is dat de werkelijke vezelconcentratie binnen dit interval zal liggen. Wanneer geen vezels worden aangetroffen wordt de bepalingsondergrens berekend die is gebaseerd op een bovengrens van 3 vezels.

windrichting is daarbij van belang. In Figuur 2 is de windrichting weergegeven die gemeten is tijdens meetperiode 1 (19 december 2023 tot en met 6 maart 2024) en meetperiode 2 (6 maart – 3 mei 2024). De gegevens over de windrichting zijn afkomstig van het KNMI-weerstation Nieuw Beerta op 17,8 km afstand ten zuidoosten van ESD. Figuur 2 geeft ook de ligging van de meetstations waarbij aangegeven is welk station bij welke windrichting stroomafwaarts ligt van ESD. En dus door de uitstoot vanaf het terrein wordt belast. In Tabel 3 is per meetperiode weergegeven op welke locaties siliciumcarbide vezels zijn aangetroffen. In Tabel 3 wordt ook de meest voorkomende windrichting gedurende de meetperiode weergegeven en wordt weergegeven over welke meetstations de wind voornamelijk heeft gewaaid gedurende de meetperiode.

Gedurende de 2e meetperiode in 2024 kwam de wind voornamelijk uit het zuidzuidwesten. In deze meetperiode zijn siliciumcarbide vezels aangetroffen op het meetstations KBM en Farmsum. In deze meetperiode hebben er meerdere blazers plaatsgevonden:

1. Op 15-03-2024 bij wind vanuit het zuiden
2. Op 21-03-2024 bij wind vanuit het noordwesten
3. Op 22-03-2024 bij wind vanuit het westzuidwesten
4. Op 03-04-2024 bij wind vanuit het zuiden
5. Op 04-04-2024 bij wind vanuit het zuidwesten

Op de momenten dat de blazers op 22-03-2024 en 04-04-2024 plaatsvonden stond er een (west)zuidwesten wind welke mogelijk hebben bijgedragen aan een verhoogde concentratie siliciumcarbide vezels op het meetstation KBM. Tijdens de blazer van 21-03-2024 stond er een noordwesten wind in de richting van meetstation Wagenborgen.



Figuur 2. *Windroos met uurgemiddelde windrichtingen tijdens de meetperiodes van het nieuwe meetnet Oosterhorn 2024 (19 december 2023 tot en met 3 mei 2024).*

Tabel 3. *De concentratie van siliciumcarbide vezels op de meetstations in meetperiode 1 (19 december 2023 – 6 maart 2024) en meetperiode 2 (6 maart – 3 mei 2024) van het nieuwe meetnet Oosterhorn in relatie tot de dominante windrichting gedurende de meetperiode.*

Meetperiode	Dominante windrichting	Wind waait voornamelijk over station(s)	Verhoogde concentraties siliciumcarbide vezels >5µm (vezels/m^3)
Periode 1 (19dec-6mrt)	WZW- ZZW	KBM, Borgsweer	RWZI, Geefweersterweg, Farmsum
Periode 2 (6mrt-3mei)	ZZW	KBM	KBM en Farmsum
Periode 3			
Periode 4			

Conclusies

Op basis van de tot nu toe uitgevoerde metingen van de concentratie van siliciumcarbide vezels op 6 meetstations kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- In de 2^e meetperiode (6 maart – 3 mei 2024) van het nieuwe meetnet in 2024 zijn op meetstations KBM en Farmsum siliciumcarbide vezels aangetroffen.
- Tijdens de 2^e meetperiode (6 maart – 3 mei 2024) hebben er vijf blazers plaatsgevonden.
- De resultaten van meetperiode 2 in 2024 passen in het eerder gevormde beeld van de verspreiding van siliciumcarbide vezels in de omgeving.
- De gemeten concentraties aan siliciumcarbide vezels hangen samen met de activiteiten op het terrein van ESD-SiC en de meteorologische condities (met name de windrichting). De relatie tussen de dominante (veel voorkomende) windrichtingen en de gevonden vezelconcentraties is nog zwak. Door activiteiten op het terrein te koppelen aan de heersende windrichting kan meer inzicht worden verkregen in de oorzaak van de emissies.
- In de 2^e meetperiode in 2024 (6 maart – 3 mei 2024) wordt op géén van de meetlocaties de door het RIVM afgeleide indicatieve jaargemiddelde risicogrens (300 vezels/m^3) overschreden.